

**Venta libre**

Hierro, aminoácidos y vitaminas en jarabe

# **ASTYFER<sup>®</sup> LIQUIDO**

Vía Oral

## **COMPOSICIÓN:**

Cada 10 ml contiene:

Glicina Hierro Sulfato 275mg

(equivalente a hierro elemental 47 mg)

L-Histidina HCl H<sub>2</sub>O BP 4mg

L-Lisina HCl USP 25mg

Tiamina HCl BP 5mg

Riboflavina (Como Fosfato  
Sódico de la Riboflavina) BP 3mg

Piridoxina HCl BP 1.5mg

Ácido Fólico BP 0.5mg

Nicotinamida BP 25mg

Cianocobalamina BP 2.5mcg

D-Panthenol USP 2.5mg

Excipientes c.s.p.

Colorante: Caramelo

Contiene: Bronopol, Sorbitol y Glucosa líquida

Astyfer Líquido (jarabe), es un suplemento nutricional compuesto por una sal de hierro, un aminoácido ligado al hierro que provee 3 aminoácidos individuales: Glicina, Histidina y Lisina.

## **INDICACIONES :**

Astyfer Líquido es un producto dietético y suplemento nutricional para prevenir la deficiencia de alguno de sus componentes en el organismo humano.

## **REACCIONES ADVERSAS Y CONTRAINDICACIONES :**

Astyfer Líquido, es bien tolerado por todos los grupos de edad y puede administrarse con seguridad.

Está contraindicado en casos de hipersensibilidad conocida a algún componente de la fórmula.

## **INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:**

Debido a que los productos orales de hierro interfieren con la absorción de la tetraciclina oral, estos productos no deben tomarse dentro de las dos horas una de la otra.

La neomicina y la colchicina pueden afectar la absorción de cianocobalamina.

La fenitoina, el metotrexato y la pirimetamina pueden interferir con la absorción de ácido fólico.

El hidrocloreuro de piridoxina puede actuar como un antagonista de la levodopa.

**PRECAUCIONES:**

La administración oral de preparados de hierro a veces produce irritación gastrointestinal con vómitos y diarrea.

La administración continua a veces puede producir estreñimiento. Las heces de los pacientes que toman suplementos de hierro pueden ser de color negro.

**ADVERTENCIAS :**

Mantener alejado de los niños.

Agitar bien antes de usar.

**SOBREDOSIFICACIÓN:** En caso de sobredosis accidental comuníquese con su médico ó concurra con este prospecto al Hospital más cercano.

**DOSIFICACIÓN :**

Administrar vía oral, 10 ml (2 cucharaditas) dos veces al día o como lo prescriba el médico.

**CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO :**

Almacenar a menos de 30°C. Proteger de la luz.

**PRESENTACIÓN :**

Frasco ámbar de 200 ml en caja individual.

N° R.S.: II-61954/2017

Importado y distribuido por:

**LABORATORIOS ALFA S.A.**

Av. Bush N° 1970 - Telf.: (591) 2-2227910

La Paz - Bolivia

[www.alfabolivia.com](http://www.alfabolivia.com)



Fabricado en India por:  
TIL HEALTHCARE PVT LTD  
100, Sri city SEZ, Irugulam Post,  
Andhra Pradesh - 517 588. India.

281212 -01R