

Venta libre

# ASTYMIN<sup>®</sup>-C

GOTAS

## Gotas de aminoácidos y vitamina C

Vía oral

### COMPOSICIÓN:

Cada ml (aprox. 20 gotas) contiene :

L-Treonina	USP	0.84 mg
L-Valina	USP	1.34 mg
L-Metionina	USP	1.84 mg
L-Isoleucina	USP	1.18 mg
L-Leucina	USP	3.66 mg
L-Fenilalanina	USP	1.00 mg
L-Triptofano	USP	1.00 mg
L-Lisina HCl	USP	5.00 mg
Acido Ascorbico	USP	100 mg
Excipientes		csp

**Excipientes:** Metil parabeno de sodio, Propil parabeno de sodio, Glucosa líquida, Sorbitol y otros c.s.

Colorante: Caramelo

**Astymin C Gotas Orales** es una asociación de vitamina C con 8 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo.

### INDICACIONES:

Astymin C gotas orales es suplemento nutricional para ser prescrito en los infantes y niños

### REACCIONES ADVERSAS y CONTRAINDICACIONES

Astymin C Gotas Orales, es bien tolerado y se puede administrarse con seguridad a los infantes. Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

La suplementación con vitamina C no se recomienda en trastornos sanguíneos como talasemia, deficiencia de G6PD, enfermedad de células falciformes y hemocromatosis.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

No es relevante, ya que la formulación es para bebés y niños.

**POSIBLES INTERACCIONES:**

Con Acetaminofeno: las dosis altas de Vitamina C pueden reducir la cantidad de acetaminofeno en la orina, lo que podría causar que aumente el nivel de este medicamento en la sangre.

Barbitúricos: los barbitúricos pueden disminuir los efectos de la vitamina C, estos medicamentos incluyen fenobarbital, pentobarbital y secobarbital.

Tomar vitamina C con el antibiótico tetraciclina puede aumentar los niveles de este medicamento, por lo que también disminuye los efectos de la vitamina C en el cuerpo.

**DOSIFICACIÓN**

Administrar en leche, agua u otro alimento líquido

Infantes: Vía Oral, 0.3 mL. (aprox. 6 gotas)

Niños hasta 12 años de edad: Vía oral, 0.35 – 0.75 mL. (aprox. 7 a 15 gotas) o como indique el médico.

Use el gotero proveído en este envase para medir la dosis.

**SOBREDOSIFICACIÓN:**

En caso sobredosis accidental consultar al médico.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:**

Tomado en la dosis recomendada, no se han reportado efectos secundarios, hasta el momento.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar a menos de 30°C. Proteger de la luz.

**PRESENTACIÓN:**

Caja de cartón con un frasco de vidrio tipo III color ámbar x 15 mL + un gotero.

Mantener alejado de los niños

No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.

T/ACL/BL/LF/1B

R.S. No.: II-62672/2017



Fabricado por:  
TIL HEALTHCARE PVT LTD  
100, Sri city SEZ, Irugulam Post,  
Andhra Pradesh - 517 588. India.  
info@tilhealthcare.com