

**ERICOX®**  
**CELECOXIB 200 mg**  
**ANALGÉSICO — ANTIINFLAMATORIO**  
**CÁPSULAS**

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento. Conserve este prospecto, puede tener la necesidad de volver a leerlo. Verifique que el envase y empaque corresponden al producto prescrito por el médico. Siga las indicaciones del médico a cargo de la prescripción o tratamiento. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Nunca dé a tomar o a utilizar su medicamento a otra persona. Guarde este medicamento en un lugar seguro, fresco y seco. No quite ni cambie el envase del medicamento. Mantenga los medicamentos fuera del alcance y vista de los niños. Consulte siempre a su médico para prevenir cualquier problema de salud y para controlar el tratamiento.

FORMA FARMACÉUTICA	COMPOSICIÓN	PRESENTACIONES	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Cápsula	Cada cápsula contiene: Celecoxib 200 mg. Excipientes: Almidón glicolato de sodio y otros c.s.p. una cápsula	Caja x 30 cápsulas	Vía oral

**ERICOX® cápsula está indicado para el tratamiento de las siguientes patologías o situaciones:** artritis reumatoidea tratamiento sintomático de inflamación y dolor en osteoartritis. Alivio de los signos y síntomas de la espondilitis anquilosante. Tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar. Manejo del dolor agudo luego de una cirugía dental y ortopédica. Tratamiento de dismenorrea primaria.

**No debe usarse ERICOX® cápsula en las siguientes situaciones:** Si es alérgico al principio activo o cualquiera de los componentes de la fórmula. En caso de alergias luego de ingerir ácido acetil salicílico u otros AINES y hayan sufrido anteriormente síntomas de asma, rinitis aguda, pólipos nasales u otras reacciones. Hipersensibilidad a sulfonamidas. En caso de ulcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal. Insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular establecida. No administrar en pacientes que presentan insuficiencia hepática o enfermedad renal.

**Precauciones generales para el uso de ERICOX® cápsula:** Se debe usar este medicamento con precaución en pacientes con compromiso de la función cardíaca. Evitar el uso conjunto con otros AINES como ibuprofeno o diclofenaco. Si está recibiendo medicación con corticoides, se debe someter a una lenta reducción de los mismos y continuar el tratamiento. En caso de presentar diabetes, tensión arterial alta, colesterol elevado, retención de líquidos, deshidratación, infecciones o es fumador, deberá informar al médico. No se recomienda el uso en menores de 18 años.

**Precauciones durante el embarazo y lactancia:** No se recomienda su uso durante embarazo y lactancia, salvo criterio médico.

**Uso en ancianos:** Generalmente no es necesario realizar un ajuste a la dosis, sin embargo en pacientes de edad avanzada con un peso menor a 50 Kg se recomienda iniciar tratamiento con dosis recomendada más baja.

**Uso con otros medicamentos:** Informe a su médico si está tomando o está bajo los efectos de otro tratamiento reciente, incluso los adquiridos sin receta. Ciertos medicamentos pueden interactuar con ERICOX® cápsula como warfarina, litio, ácido acetilsalicílico u otro antiinflamatorio, inhibidores de la ECA (como enalapril, captopril, lisinopril), antagonistas de la angiotensina II (candesartán, losartán, valsartán), fluconazol, furosemida.

**La dosificación y duración del tratamiento** deberá ser establecida por el médico, como referencia se sugieren las siguientes pautas de dosificación:

- Osteoartritis: 200 mg (1 cápsula) cada 24 horas.
- Artritis reumatoidea: 200 mg (1 cápsula) cada 12 horas.

- Espondilitis anquilosante: 200 mg (1 cápsula) cada 24 horas. Si no se observan efectos después de 6 semanas se puede aumentar la dosis a 400 mg (2 cápsulas) cada 12 horas.
- Dolor agudo y dismenorrea primaria: 400 mg (2 cápsulas) en una sola toma como dosis de ataque el primer día, en días siguientes la dosis recomendada es de 200 mg (1 cápsula) cada 12 horas.
- Adenoma poliposo familiar (FAP): 400 mg (2 cápsulas) cada 12 horas, administrados entre comidas.

**Si olvidó tomar ERICOX® cápsula,** no tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada, tómela tan pronto como se acuerde.

**Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental,** consultar inmediatamente a su médico o asistir al Centro de Salud más próximo, llevando el prospecto del medicamento. Los síntomas tras una sobredosis aguda incluyen: letargo, somnolencia, náuseas, vómitos y dolor epigástrico, que son generalmente reversibles con tratamiento de soporte. Puede suceder sangrado gastrointestinal.

El tratamiento generalmente consiste en disminuir la absorción y se debe realizar inducción a la emesis o vómito, administrar carbón activado; para reforzar su eliminación puede ser administrado un purgante osmótico dentro de las 4 horas de ingestión. La hemodiálisis no es muy eficaz por la absorción proteica del celecoxib. Se deberá monitorear y apoyar las funciones vitales.

**Posibles efectos adversos:** Dispepsia y dolor abdominal, constipación, diverticulitis, disfga, eructos, gastritis, gastroenteritis, reflujo gastroesofágico, edema periférico, rash, urticaria y/o prurito, mareos, somnolencia, insomnio, hipertensión, efectos que desaparecen al discontinuar el medicamento.

**Conservación:** Manténgase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor de 30°C. Protégase de la luz y la humedad.

**ERICOX® cápsula es un medicamento de venta con receta médica.**

**Registro sanitario en Bolivia: II-66586/2018**

**ERICOX® cápsula es fabricado por:**

WEXFORD LABORATORIES Pvt. Ltd.  
 Reg. Q.F. Mr. Deepak Badrinarayan Plot N° 18, KIADB Industrial Area, 1st Phase, Antharasanahally, Tumkur - 572106, India.  
 Empresa asociada a Wexford Laboratories Inc., 300 Centerville Road, Summit East, Suite 250, Warwick. R.I. - USA

**Para: Laboratorios Alfa S.A.**

Dir. Tec. Fco. Juan J. Ferrer. Matrícula F-57.  
 Av. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910  
 La Paz - Bolivia.  
 www.alfabolivia.com

