

ESPASMO TROPINA®

Antiespasmódico - Anticolinérgico

CONSEJOS AL USUARIO:

- Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.
- Conserve este prospecto. Puede tener la necesidad de volver a leerlo.
- Verifique que el envase y empaque corresponden al producto prescrito por el médico.
- Utilice el medicamento tal y como se lo indicó su médico.
- Siga las normas de higiene, asepsia y seguridad requeridas para la manipulación correcta del medicamento.
- Nunca dé a tomar o a utilizar su medicamento a otra persona.
- Lávese las manos antes de utilizar el medicamento.
- Conserve los medicamentos de acuerdo a las instrucciones indicadas en este prospecto.
- No quite ni cambie el envase del medicamento.
- Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos, incluso los desechados, fuera del alcance de los niños.
- Consulte siempre a su médico si tiene alguna duda, si los síntomas persisten, empeoran o si aparecen síntomas nuevos.

FORMAS FARMACEUTICAS	COMPOSICION	PRESENTACIONES	VIA DE ADMINISTRACION
1. Comprimidos	Cada comprimido contiene: Escopolamina (Hioscina) Butilbromuro 10 mg Excipientes c.s.p. 1 comprimido.	Caja x 100 comprimidos Caja x 250 comprimidos	Vía oral
2. SOLUCIÓN INYECTABLE (AMPOLLAS)	Cada ampolla inyectable contiene: Escopolamina (Hioscina) Butilbromuro 20 mg, excipiente isotónico estéril c.s.p. 1 mL.	Caja x 25 ampollas Caja x 100 ampollas	Vía intramuscular Vía intravenosa

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiespasmódico, anticolinérgico.

INDICACIONES: Este medicamento está indicado para:

- Espasmos viscerales y de la musculatura lisa.
- Dismenorrea espasmódica.
- Cólicos intestinales, hepáticos, renales y ureterales.
- Úlcera péptica aguda con espasticidad.
- Facilita el examen radiológico del tracto gastrointestinal.
- Rigidez del cuello uterino durante el parto.

FORMA DE USO:

Comprimidos: Tomar 30 minutos a 1 hora antes de las comidas, a menos que el médico le indique de otra manera.

Ampollas: Seguir las instrucciones del médico.

DOSIFICACIÓN Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Según criterio médico. Se sugiere la siguiente pauta posológica:

Comprimidos: 10-20 mg (1 a 2 comprimidos) cada 6 a 8 horas.

Ampollas: 20 mg (1 ampolla) cada 6 a 8 horas por vía intramuscular o intravenosa. En caso de espasmos viscerales agudos, puede repetirse la dosis a los 30 minutos.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar este medicamento en las siguientes enfermedades:

Glaucoma, íleo obstructivo o paralítico, hipertrofia prostática, estenosis pilórica, insuficiencia renal grave, procesos obstructivos gastrointestinales, hipersensibilidad al medicamento.

PRECAUCIONES:

Las siguientes enfermedades requieren que el médico realice una evaluación previa antes de recetar este medicamento.

- Insuficiencia cardíaca renal o hipertiroidismo.
- Pacientes de más de 40 años (administración parenteral) y ancianos.
- Embarazo, lactancia, toxemia del embarazo.
- Enfermedad cardiovascular severa.
- Esofagitis de reflujo.
- Hernia hiatal.
- Hemorragia aguda.
- Atonía intestinal en ancianos y debilitados.
- Miastenia gravis.
- Parálisis espástica en niños.
- Colitis ulcerativa.

ADVERTENCIAS:

Durante el tratamiento con este medicamento se recomienda:

- No manejar vehículos ni maquinaria peligrosa.
- No ingerir bebidas alcohólicas

- No realizar tareas que requieren gran atención y cuidado.
- Utilizar gafas de sol.

Importante para la mujer: Si está embarazada, cree que pueda estarlo o está en período de lactancia, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo, puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

INTERACCIONES:

Antes de iniciar el tratamiento, es conveniente notificar al médico si el paciente recibe otras medicaciones o está bajo los efectos de otro tratamiento reciente.

Se podrían producir interacciones con: otros anticolinérgicos, IMAO, antihistamínicos, butirofenonas, fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos, glucocorticoides, ACTH, haloperidol y antiácidos, cloruro de potasio, antidiarréicos, antimiasmáticos, metoclopramida, analgésicos narcóticos, antiparkinsonianos, ketoconazol, quinidina.

Este medicamento puede alterar la disponibilidad de la digoxina y reduce la absorción de las fenotiazinas.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Los efectos adversos son en general leves y transitorios.

Las reacciones más características son: sequedad de boca, nariz y garganta, visión borrosa.

Ocasionalmente: alteraciones del gusto, náuseas, vómitos, disfagia, estreñimiento, íleo paralítico, retención urinaria, trastornos de la acomodación, midriasis, fotofobia, glaucoma, palpitaciones, cefalea, confusión mental, mareos, somnolencia, urticaria y reacción anafiláctica. Depresión SNC.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comunique a su médico o a través de nuestra página:

<https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>

SOBREDOSIS:

En caso de ingestión accidental o intoxicación por sobredosis, consultar inmediatamente a su médico o asistir al Centro de Salud más próximo, llevando el prospecto del medicamento.

CONSERVACIÓN:

Comprimidos: Guardar en el envase sellado de origen, protegido de la luz y a temperatura menor a 30°C.

Ampollas: Conservar el envase cerrado de origen en lugar fresco, a temperatura menor a 30°C. Evitar la congelación.

DISPENSACIÓN Y VENTA:

Comprimidos: Medicamento de venta libre.


Ampollas: Medicamento de venta con receta médica.

FORMA DE USO:

Las ampollas que se utilizan en el envasado de la solución inyectable han sido fabricadas con vidrio de calidad para uso farmacéutico y tecnología altamente especializada que las provee del punto POC (Punto Óptico de Corte), el cual permite una apertura segura, fácil y rápida. No se requiere el uso de sierra para abrir la ampolla.

Sujete la ampolla con los dedos pulgar e índice por la zona próxima al cuello, de modo que el punto POC quede frente a su vista. Al mismo tiempo, sujete con la otra mano la cabeza de la ampolla y presione hacia atrás, tal como se muestra en el dibujo.

APERTURA DE LA AMPOLLA EN EL PUNTO ÓPTICO DE CORTE



Registros Sanitarios en Bolivia:

ESPASMO TROPINA® Comprimido: NN-24055/2017

ESPASMO TROPINA® Inyectable: NN-24056/2018

ESPASMO TROPINA® es fabricado por:
LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer. M. Prof. No. F-57

Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910

La Paz - Bolivia

www.alfabolivia.com

