

# ETORINEST®

**Etoricoxib 90 - Etoricoxib 120 mg**

**Antiinflamatorio y Antirreumático no esteroideo - Coxib  
Comprimidos Recubiertos**

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento. Conserve este prospecto, puede tener la necesidad de volver a leerlo. Verifique que el envase y empaque corresponden al producto prescrito por el médico. Siga las indicaciones del médico a cargo de la prescripción o tratamiento. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Nunca dé a tomar o a utilizar su medicamento a otra persona. Guarde este medicamento en un lugar seguro, fresco y seco. No quite ni cambie el envase del medicamento. **Mantenga los medicamentos fuera del alcance y vista de los niños. Consulte siempre a su médico para prevenir cualquier problema de salud y para controlar el tratamiento.**

FORMA FARMACÉUTICA	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Comprimidos recubiertos	<b>ETORINEST® 90:</b> Cada comprimido recubierto contiene: Etoricoxib 90 mg. Excipientes: Lactosa, almidón de maíz y otros c.s.	Caja x 10 comprimidos	Vía oral
	<b>ETORINEST® 120:</b> Cada comprimido recubierto contiene: Etoricoxib 120 mg. Excipientes: Lactosa, almidón de maíz y otros c.s.		

**ETORINEST®** contiene Etoricoxib que es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que pertenece al grupo de inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2).

**ETORINEST® está indicado para el tratamiento de las siguientes patologías o situaciones:** En adultos y adolescentes mayores de 16 años para el alivio sintomático de la Artrrosis, Artritis Reumatoidea (A.R.), Espondilitis anquilosante y para el dolor y signos de inflamación asociados a la Artritis Gotosa Aguda.

También está indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado asociado a cirugía dental.

**No debe usarse ETORINEST® en las siguientes situaciones:** Hipersensibilidad al etoricoxib o a alguno de los componentes de este medicamento. Si es alérgico a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos incluyendo la aspirina y los inhibidores de la COX-2. Si tiene úlcera o hemorragia de estómago o duodenal. En caso de enfermedades graves de hígado o riñón. No se recomienda su uso en embarazo y lactancia. *No recomendado en menores de 16 años.* Si presenta una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o colitis. En hipertensión arterial no controlada con tratamiento. Problemas cardíacos incluyendo insuficiencia cardíaca, angina de pecho, si ha sufrido infarto de miocardio, revascularización quirúrgica, enfermedad arterial periférica, enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica. Si ha presentado cualquier tipo de infarto cerebral.

**Precauciones generales para el uso de ETORINEST®:** Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con Etoricoxib si tiene antecedentes de úlceras o hemorragia de estómago. Si esta deshidratado como consecuencia de una enfermedad prolongada con vómitos o diarrea. Si presenta hinchazón debido a retención de líquidos. En caso de antecedentes de insuficiencia cardíaca o cualquier otra enfermedad cardíaca. Etoricoxib puede aumentar la tensión arterial en algunas personas, especialmente en dosis elevadas, por tanto, es necesario controlar la tensión arterial.

Se debe tener especial precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades hepáticas o renales.

Si está siendo tratado por una infección, Etoricoxib puede enmascarar o encubrir la fiebre, por tanto, comunique a su médico en estos casos.

En caso de diabetes, colesterol elevado, fumador también comunique a su médico ya que puede existir riesgo de sufrir enfermedad cardíaca.

En pacientes mayores de 65 años, se les debe realizar un control adecuado.

**Precauciones durante el embarazo y lactancia:** No se debe administrar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el periodo de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea favorable.

**Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:** En algunos pacientes que toman Etoricoxib se han comunicado mareos y somnolencia, no conduzca o utilice herramientas o máquinas si experimenta estos síntomas.

**Información importante sobre algunos de los componentes:** Este medicamento contiene lactosa, si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

**Uso con otros medicamentos:** Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Si está utilizando alguno de los siguientes medicamentos, puede que su médico quiera controlarle para comprobar que sus medicamentos funcionan adecuadamente una vez que empiece a tomar Etorinest®: medicamentos anticoagulantes, como Warfarina. Rifampicina, Metotrexato, Ciclosporina o Tacrolimus, Litio, medicamentos utilizados para ayudar a controlar la tensión arterial alta y la insuficiencia cardíaca denominados inhibidores de la ECA y antagonistas del receptor de angiotensina, como Enalapril y Ramipril, Losartán y Valsartán, diuréticos, Digoxina, Minoxidil, comprimidos o solución oral de Salbutamol. Los anticonceptivos orales y la terapia hormonal de sustitución pueden aumentar el riesgo de efectos adversos.

El riesgo de úlceras en el estómago es mayor si toma etoricoxib con aspirina u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

**Dosificación y duración del tratamiento:** Como referencia se sugieren las siguientes pautas de dosificación:

–**Artrrosis (Osteoartritis):** La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día, aumentándose hasta un máximo de 60 mg una vez al día si fuese necesario. En ausencia de un aumento en el beneficio terapéutico, deben considerarse otras opciones terapéuticas.

–**Artritis reumatoidea:** La dosis recomendada es de 60 mg una vez al día, aumentándose hasta un máximo de 90 mg una vez al día si es necesario.

–*Espondilitis anquilosante*. La dosis recomendada es de 60 mg una vez al día, aumentándose hasta un máximo de 90 mg una vez al día si fuese necesario.

–*Situaciones de dolor agudo*: Etoricoxib sólo debe utilizarse durante el periodo de dolor agudo.

–*Gota*: La dosis recomendada es de 120 mg una vez al día que sólo debe utilizarse durante el periodo de dolor agudo, limitada a un máximo de 8 días de tratamiento.

–*Dolor post operatorio tras cirugía dental*: La dosis recomendada es de 90 mg una vez al día limitada a un máximo de 3 días de tratamiento.

–*Pacientes con problemas hepáticos*: Si tiene una enfermedad leve de hígado no debe tomar más de 60 mg al día. Si tiene una enfermedad moderada de hígado no debe tomar más de 30 mg al día.

–*Pacientes mayores de 65 años*: No es necesario un ajuste de dosis en pacientes mayores de 65 años, sin embargo se debe tener precaución en pacientes de edad avanzada.

Si olvidó tomar ETORINEST® como fue indicado, límitese a reanudar el régimen habitual al día siguiente,

*Forma de administración*: Se puede tomar con o sin alimentos.

**Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental** comuníquese con su médico o concurra con este prospecto al Centro de Salud más cercano. Luego de realizar una evaluación clínica cuidadosa y según el tiempo transcurrido desde la ingesta o administración, se debe emplear las medidas de apoyo habituales: evacuación gástrica del medicamento no absorbido, monitoreo clínico gastroduodenal y de la función renal y realizar el tratamiento de soporte si es necesario.

**Posibles efectos adversos:** *Muy frecuentes*: Dolor abdominal.

*Frecuentes*: Osteítis alveolar, edema/retención de líquidos, mareo, cefalea, palpitaciones, arritmia, hipertensión, broncoespasmo, estreñimiento, flatulencia, gastritis, ardor de estómago, reflujo ácido, dispepsia, malestar epigástrico, náuseas, vómitos, esofagitis, úlcera bucal, AST y ALT elevados, equimosis, astenia, fatiga. *Poco frecuentes*: gastroenteritis, anemia, hipersensibilidad, ansiedad, depresión, disgeusia, insomnio, parestesias, visión borrosa, acúfenos, vértigo, fibrilación auricular, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, cambios en el ECG, angina de pecho, infarto de miocardio, rubefacción, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, tos, disnea, epistaxis, distensión abdominal, boca seca, úlcera gastroduodenal, úlcera péptica, síndrome de intestino irritable, pancreatitis, edema facial, prurito, erupción, eritema, urticaria, calambre, espasmo muscular, proteinuria, dolor torácico, N.U.S. elevado, CPK elevado, hiperpotasemia, ácido úrico aumentado. *Raras*: angioedema, reacciones anafilácticas incluyendo shock, confusión, inquietud, hepatitis, insuficiencia hepática, ictericia, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, erupción fija medicamentosa, sodio disminuido en sangre.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comuníquese a su médico o a través de nuestra página <https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>.

**Conservar ETORINEST® a temperatura ambiente inferior a 30 °C, protegido de la luz y humedad.**

**MEDICAMENTO DE VENTA CON RECETA MÉDICA**

ETORINEST® 90: N° R.S.: II-80854/2022

ETORINEST® 120: N° R.S.: II-80795/2022

**Mfg. Lic. No.:** G/25/1749

**ETORINEST® es fabricado por:**

GLOBELA PHARMA PVT.LTD.

Dir. Tec. Fca.: Ms. Ushaben Patel

357-358. G.I.D.C. Sachin, Surat 394230

Gujarat, India.

**Para:** LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec.Fco.: Juan J. Ferrer. Matrícula F-57

Avda. Busch No 1970. Telf.: (591)2-2227910

La Paz - Bolivia

[www.alfabolivia.com](http://www.alfabolivia.com)

