

FENO FUCSINA®

Antiséptico de piel y mucosas

CONSEJOS AL PACIENTE:

- Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.
- Conserve este prospecto. Puede tener la necesidad de volver a leerlo.
- Utilice el medicamento tal y como se lo indicó su médico.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Nunca dé a tomar o a utilizar su medicamento a otra persona.
- Lávese las manos antes de utilizar el medicamento.
- Guarde sus medicamentos en un lugar seguro, fresco y seco.
- No quite ni cambie el envase del medicamento.
- **Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.**
- **Consulte siempre a su médico para prevenir cualquier problema de salud y para controlar el tratamiento.**

1. NOMBRE GENÉRICO: FUCSINA BÁSICA, ÁCIDO FÉNICO, RESORCINA.

2. FORMA FARMACÉUTICA: Solución de uso tópico.

3. FÓRMULA: Cada 100 ml de solución tópica contienen: Fucsina básica 0,3 g, Fenol 4,5 g, Resorcinol 10,0 g. Excipientes: Acetona, Etanol 96% v/v, Glicerol y Agua Purificada c.s.

4. PRESENTACIÓN: Frasco de 10 ml con espátula.

5. ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiséptico de piel y mucosas.

La solución antiséptica presenta un efecto desinfectante eficaz frente a:

- Bacterias gram-positivas y gram-negativas.
- Hongos patógenos y virus.

Su acción antiséptica y antipruriginosa permanece por largo tiempo, a pesar de las secreciones que puedan existir en el lugar de aplicación.

6. INDICACIONES: El uso de esta solución está indicado en Odontología, Dermatología, Ginecología y Cirugía en general; así como en las siguientes afecciones:

- Dermatitis superficial.
- Dermatitis eczematosa húmeda.
- Estomatitis catarral y aftosa.
- Mughet.
- Infecciones labiales de distinta etiología.

7. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía tópica.

8. DOSIFICACIÓN Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Según criterio médico.

Se sugiere la siguiente pauta posológica: 1 a 4 aplicaciones al día, correspondiendo la última aplicación al momento de acostarse.

9. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al medicamento. No aplicar en heridas ni en piel erosionada.

10. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Reducir el número de aplicaciones sobre áreas extensas de piel dañada. El uso continuo del medicamento por periodos prolongados puede producir efectos secundarios sistémicos.

Las aplicaciones frecuentes en la piel próxima a la zona tratada, pueden producir irritación y sequedad, por lo que se debe evitar el contacto con la piel que rodea la zona tratada.

Recurrir al médico si los síntomas empeoran o persisten.

Embarazo y lactancia: Seguir estrictamente las indicaciones del médico.

11. INTERACCIONES: No aplicar juntamente con otras soluciones de uso tópico.

Antes de iniciar el tratamiento, es conveniente notificar al médico si el paciente recibe otras medicaciones o está bajo los efectos de otro tratamiento reciente.

12. EFECTOS SECUNDARIOS: Hipersensibilidad con irritación y dermatitis de contacto.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comuníquese a su médico o a través de nuestra página: <https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>.

13. SOBREDOSIS: En caso de uso continuo prolongado o de ingestión accidental se puede presentar diarrea, náuseas, cólicos, bradicardia, rubefacción, descamación de la piel y metahemoglobinemia. En el caso de intoxicación o de que se presenten estos síntomas, debe consultar inmediatamente a su médico o asistir al Centro de Salud más próximo, llevando el prospecto del medicamento.

14. CONSERVACIÓN: Guardar el frasco bien cerrado, a temperatura ambiente inferior a 30 °C, protegido de la luz.

15. DISPENSACIÓN Y VENTA: Medicamento de venta con receta médica.

16. FORMA DE USO: La presentación en frasco gotero permite un uso adecuado e higiénico del producto, facilita la dosificación en la espátula, favorece la aplicación precisa en el lugar requerido y evita derrames accidentales.

La forma adecuada de usar el producto es la siguiente:


Lávese las manos y la zona donde va a aplicar la Feno Fucsina.

1. Con movimiento de rotación rompa el anillo de seguridad y retire la tapa.

2. Incline el frasco gotero y deposite 1 ó 2 gotas sobre la espátula, frotando con el gotero sobre la misma y aplique en la zona afectada de la piel o de la mucosa (labio, encías, etc.)

3. Cierre el frasco, lave la espátula con agua corriente y guarde en la caja.

Opcionalmente y de acuerdo al tratamiento, pueden utilizarse torundas de algodón (palitos con algodón desechables).



Registro Sanitario en Bolivia: NN-17957/2019

FENO FUCSINA® es fabricado por:
LABORATORIOS ALFA S.A.
Dir. Tec. Fco. Juan J. Ferrer M. Prof. No. F-57
Avda. Busch N° 1970 Tel.: (591) 2-2227910
La Paz - Bolivia
www.alfabolivia.com

