

FER ALFA NF

SULFATO FERROSO

ANTIANÉMICO, SUPLEMENTO DE HIERRO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento. Conserve este prospecto, puede tener la necesidad de volver a leerlo. Utilice el medicamento tal y como se lo indicó su médico. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Nunca dé a tomar o a utilizar su medicamento a otra persona. Lávese las manos antes de utilizar el medicamento. Guarde sus medicamentos en un lugar seguro, fresco y seco. No quite ni cambie el envase del medicamento. **Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consulte siempre a su médico para prevenir cualquier problema de salud y para controlar el tratamiento.**

FORMAS FARMACÉUTICAS	COMPOSICIÓN	PRESENTACIONES	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Comprimidos	Cada comprimido contiene: Sulfato ferroso 200 mg equivalente a 60 mg de hierro elemental. Excipientes: amarillo tartrazina y otros c.s.	Caja x 250 comprimidos	Vía oral
Gotas orales	Cada mililitro contiene: 125 mg de sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro elemental (1 mg de hierro elemental / gota). Excipientes: glucosa, glicerina, etanol (0,13 % v / v) y otros c.s.	Caja con 1 frasco gotero x 15 ml	

El hierro es un constituyente esencial del organismo humano, necesario para la formación de la hemoglobina de los eritrocitos y para los procesos oxidativos de los tejidos. **FER ALFA® NF** en sus dos presentaciones proporciona este elemento en forma de sulfato ferroso.

FER ALFA® NF está indicado para las siguientes patologías o situaciones:

Tratamiento y profilaxis de las anemias por deficiencia de hierro: Anemia microcítica, anemia simple del embarazo, anemia nutricional de los niños, anemias hemorrágicas agudas y crónicas y anemias debidas a parasitosis.

No debe usarse FER ALFA® NF en las siguientes situaciones: Hemocromatosis, hemosiderosis y anemias hemolíticas. Úlcera péptica, enteritis regional, colitis ulcerativa. Hipersensibilidad al medicamento.

Precauciones generales para el uso de FER ALFA® NF: No sobrepasar las dosis recomendadas. Tomar siempre el medicamento inmediatamente después de las comidas. Alcoholismo, insuficiencia hepática y/o renal. Este medicamento en gotas orales tiene en su composición:

- 0,4 gramos de glucosa por ml (0,02 gramos / gota) lo que debe ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

- Glicerina, que puede ser perjudicial a dosis elevadas, puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Los comprimidos de este medicamento contienen como excipiente:

- Amarillo tartrazina, por lo que pueden causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

Embarazo y Lactancia: Seguir estrictamente al consejo médico.

Uso con otros medicamentos: Antes de iniciar el tratamiento es conveniente notificar al médico si el paciente recibe otras medicaciones o está bajo los efectos de otro tratamiento reciente.

Separar la administración concurrente de tetraciclinas por lo menos con un intervalo de dos horas.

Dosificación y duración del tratamiento:

Según prescripción médica. Se sugiere la siguiente pauta posológica:

Adultos: 1-4 comprimidos al día (60-240 mg de hierro elemental repartidos en 1-4 tomas).

Niños de 6 a 12 años: 1-2 comprimidos al día (60-120 mg de hierro elemental en 1-2 tomas).

Niños de 1 a 5 años: 15-45 gotas al día (15-45 mg de hierro elemental) repartidas en 3-4 tomas.

Niños menores de 1 año: 10-25 gotas al día (10-25 mg de hierro elemental) repartidas en 3-4 tomas.

Es conveniente iniciar la terapia con dosis bajas que se aumentan progresivamente hasta alcanzar la dosis terapéutica óptima. Una vez alcanzados los niveles normales de hemoglobina al cabo de unas 10 semanas, es necesario mantener el tratamiento con la mitad de la dosis de ataque durante 6 meses con la finalidad de que el hierro pueda almacenarse en el organismo.

FORMA DE USO: Administrar el medicamento inmediatamente después de las principales comidas.

Cuando la administración es en gotas, diluir el medicamento en una pequeña cantidad de zumo de frutas o agua azucarada; evitar el contacto con los dientes al ingerir el líquido.

Ante la eventualidad de una sobredosis ó ingesta accidental: Consultar inmediatamente a su médico o asistir al Centro de Salud más próximo, llevando el prospecto del medicamento.

Posibles efectos adversos: Las dosis altas pueden producir alteraciones gastrointestinales. La administración continua de sales de hierro puede producir estreñimiento. Los preparados orales líquidos de sales de hierro pueden manchar los dientes. Las heces de los pacientes que toman preparados de hierro pueden colorearse de negro.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos

no descritos en este prospecto, comuníquese a su médico o a través de nuestra página: <https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>.

Conservar FER ALFA® NF en su envase de origen bien cerrado, a temperatura ambiente inferior a 30°C, protegido de la luz.

MEDICAMENTO DE VENTA CON RECETA MÉDICA

Registros Sanitarios en Bolivia:

Comprimidos: NN-24348/2017

Gotas Orales: NN-24349/2018

FER ALFA® NF es fabricado por:
LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer. M. Prof. No. F-57
Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910

La Paz - Bolivia

www.alfabolivia.com

