

# FOSCAL®

## COMPRIMIDO MASTICABLE

### SUPLEMENTO DE CALCIO, FÓSFORO, FLÚOR Y VITAMINA D<sub>2</sub>

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento:

Conserve este prospecto, puede tener que volver a leerlo. Utilice el medicamento tal y como se lo indicó su médico. Si tiene alguna duda, consulte siempre a su médico o farmacéutico. Nunca dé a tomar o utilizar su medicamento a otra persona. Lávese las manos antes de utilizar el medicamento. Guarde sus medicamentos en lugar seguro, fresco y seco. No quite ni cambie el envase del medicamento. Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. Informe al médico si los síntomas persisten, empeoran o si aparecen síntomas nuevos.

FORMAS FARMACEUTICAS	COMPOSICION	PRESENTACIONES	VIA DE ADMINISTRACION
Comprimidos masticables	Cada comprimido contiene: Fosfato tricálcico 100 mg Gluconato cálcico 100 mg Glicerofosfato cálcico 40 mg Lactato cálcico 40 mg Floruro cálcico 1,2 mg Vitamina D2 200 UI Sacarosa 1,5 g Excipientes c.s.p. 1 comprimido  Cada comprimido aporta 60 mg de Calcio	Caja x 100 comprimidos masticable	Vía oral

**1. ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Suplemento de calcio, fósforo, flúor y vitamina D<sub>2</sub>. FOSCAL® aporta los elementos necesarios para una eficiente reposición de calcio en el organismo. El calcio, fósforo y vitamina D están directamente interrelacionados en el metabolismo del calcio, lo cual es fundamental para las funciones muscular, nerviosa y cardíaca; así como para el mantenimiento de muchos procesos vitales. El flúor absorbido se deposita especialmente en las estructuras óseas en crecimiento y, en el caso de los dientes, hace que el esmalte dentario sea más duro y resistente al ataque de los ácidos segregados por las bacterias, evitando así la caries dental.

#### 2. INDICACIONES:

- Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de calcio.
- Hipocalcemia crónica.
- Raquitismo.
- Trastornos dentarios.
- Convalecencias, pérdidas de peso y apetito.
- Embarazo, lactancia y crecimiento.
- Coadyuvante en la profilaxis y tratamiento de la osteoporosis.

**3. DOSIFICACIÓN Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:** Según criterio médico. Se sugiere la siguiente pauta posológica:

Adulto: 2 comprimidos, 3 veces al día.

Niños: 1 - 2 comprimidos, 3 veces al día.

Administrar 1 a 2 horas después de las comidas.

**4. CONTRAINDICACIONES:** Hipercalcemia. Hipercalciuria. Cálculos renales de calcio. Insuficiencia renal grave.

**5. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Administrar con precaución a pacientes con disfunción renal leve y/o con historia previa de cálculos renales.

No tome los suplementos de calcio antes o después de comer alimentos que contengan mucha fibra, tales como salvado, pan integral o cereales integrales, especialmente si está en tratamiento para la hipocalcemia.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

Este medicamento contiene 1,5 g de Sacarosa por comprimido, lo que debe ser tomado en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa / galactosa, deficiencia de sacarasa - isomaltasa y pacientes diabéticos.

Embarazo y lactancia: Seguir estrictamente el consejo del médico.

**6. INTERACCIONES:** Antes de iniciar el tratamiento es conveniente notificar al médico si el paciente recibe otras medicaciones o está bajo los efectos de otro tratamiento reciente.

El tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas que contienen cafeína (té, café, refresco con cafeína) disminuyen la absorción de calcio.

**7. EFECTOS SECUNDARIOS:** Ocasionalmente puede haber constipación.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comunique a su médico o a través de nuestra página: <https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>.

**8. SOBREDOSIS:** En caso de ingestión accidental o por tratamientos largos, consultar inmediatamente a su médico o asistir al Centro de Salud más próximo, llevando el prospecto del medicamento.

**9. CONSERVACIÓN:** Guardar bien cerrado, en lugar fresco (máximo a 30°C), seco y protegido de la luz.

**10. DISPENSACIÓN Y VENTA:** Medicamento de venta libre.

**11. FORMA DE USO:** Las tabletas pueden disolverse en la boca o masticarse.

Registro Sanitario en Bolivia: NN-27365/2018

**FOSCAL®** es fabricado por:  
**LABORATORIOS ALFA S.A.**

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer. M. Prof. No. F-57

Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910

La Paz - Bolivia

[www.alfabolivia.com](http://www.alfabolivia.com)

