

## FOSCAL® GRANULADO

### **Suplemento de Calcio, Fósforo, Flúor y Vitamina D.**

**Formula por unidad de dosis:** Fosfato tricálcico 200 mg, Gluconato cálcico 200 mg.

Glicerofosfato cálcico 80 mg, Lactato cálcico 80 mg, Fluoruro cálcico 2,4 mg, Vitamina D2 400 UI, Sacarosa 3,4 g y otros excipientes c.s.p. 4 g. Cada 4 g de granulado aportan 120 mg de Calcio elemental.

**Acción terapéutica:** Foscal® provee la Vitamina D y los elementos necesarios para una eficiente reposición de calcio en el organismo.

**Indicaciones:** Hipocalcemia crónica. Raquitismo. Trastornos dentarios. Convalecencias, pérdidas de peso y apetito. Embarazo, lactancia y crecimiento. Coadyuvante en la profilaxis y tratamiento de la osteoporosis.

**Dosificación, vía de administración y duración del tratamiento:** Salvo criterio médico se recomienda la siguiente posología:

Adultos: 1 ó 2 cucharillas de 5 ml (4 a 8 g de granulado), tres veces al día. Niños: 1/2 ó 1 cucharilla de 5 ml (2 a 4 g de granulado), tres veces al día. El granulado puede mezclarse con un poco de agua, leche o yogur para facilitar su administración oral. Administrar 1 a 2 horas después de las comidas, durante 5 a 10 días, pudiendo prolongar el tratamiento.

**Contraindicaciones:** Hipercalcemia. Hipercalciuria. Cálculos renales de calcio. Insuficiencia renal grave.

**Precauciones y advertencias:** Administrar con precaución a pacientes con disfunción renal leve y/o con historia previa de cálculos renales. No tome los suplementos de calcio antes o después de comer alimentos que contengan mucha fibra. Este medicamento contiene 3,4 g de Sacarosa por cada cucharilla de granulado lo que debe ser tomado en cuenta en pacientes con intolerancia a determinados azúcares y en pacientes diabéticos recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

**Embarazo y Lactancia:** Seguir estrictamente el consejo del médico. Interacciones: El tabaco, las bebidas alcohólicas, las bebidas que contienen cafeína (té, café, refrescos con cafeína) y los alimentos con elevado contenido en fibra, como el salvado o el pan integral, disminuyen la absorción de calcio.

**Efectos secundarios:** Las sales de calcio pueden ocasionar constipación o estreñimiento. En caso de que eventualmente se produjera una intoxicación por sobredosis consultar inmediatamente a su médico o asistir al Centro de Salud más próximo, llevando el envase del medicamento. Consulte a su médico si observa otros efectos secundarios.

**Conservación:** En su envase cerrado, a temperatura inferior a 30 °C, protegido de la luz.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE, Contenido:** 150 g

Fabricado por: Laboratorios Alfa S.A

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer Matrícula F-57

Avda Busch N° 1970-Tel.: (591)2-2227910

La Paz Bolivia. [www.alfabolivia.com](http://www.alfabolivia.com)

