

HELLER® Plus
ÁCIDO SALICÍLICO AL 20 %
ELIMINA VERRUGAS, CALLOS Y DUREZAS
SOLUCIÓN TÓPICA

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento. Conserve este prospecto, puede tener la necesidad de volver a leerlo. Verifique que el envase y empaque corresponden al producto prescrito por el médico. Siga las indicaciones del médico a cargo de la prescripción o tratamiento. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Nunca dé a tomar o a utilizar su medicamento a otra persona.

Guarde este medicamento en un lugar seguro, fresco y seco. No quite ni cambie el envase del medicamento.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance y vista de los niños. Consulte siempre a su médico para prevenir cualquier problema de salud y para controlar el tratamiento.

FORMA FARMACEUTICA	COMPOSICION	PRESENTACION	VIA DE ADMINISTRACION
Solución tópica	Cada 100 g de solución contienen: Ácido salicílico 20 g. Excipientes: ácido láctico, aceite de ricino, alcohol 96 % v/v y otros excipientes c.s.	Caja x 1 frasco x 10 ml	Vía tópica

HELLER® Plus contiene ácido salicílico al 20%, este actúa como queratolítico y produce el desprendimiento de la hiperqueratosis de forma gradual; suaviza, ablanda y destruye el estrato córneo de la piel incrementando la hidratación endógena (concentración de agua), probablemente por la disminución del pH, lo que hace que el epitelio córneo de la piel se inflame, suavice y luego se descame.

La humedad es esencial para que el ácido salicílico pueda ejercer su acción sobre la piel y para que se produzca la maceración y descamación/exfoliación de la epidermis.

La acción queratolítica se usa para el tratamiento de callos, durezas y verrugas.

La necrosis de la piel normal se ha relacionado con una mala utilización (uso abusivo) de la medicación. A elevadas concentraciones (mayores al 20% de ácido salicílico) su acción es cáustica. El ácido salicílico tiene también una leve acción antiséptica en la piel.

HELLER® Plus está indicado para el tratamiento de las siguientes patologías o situaciones: En adultos y niños mayores de 12 años para el tratamiento tópico de la hiperqueratosis (engrosamiento en la parte externa de la piel), permitiendo la eliminación de callos, durezas o verrugas.

No debe usarse HELLER® Plus en las siguientes situaciones: Si es alérgico al ácido salicílico o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Si padece problemas de circulación periférica. Si tiene diabetes. En áreas o zonas de la piel donde exista lunares, infecciones, irritaciones, inflamaciones o con heridas. En niños menores de 2 años.

Precauciones generales para el uso de HELLER® Plus:

Heller® Plus es un medicamento exclusivamente para uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con la piel sana, cara, ojos, mucosas. Evitar el uso sobre amplias zonas o

durante mucho tiempo. Aunque se realice una aplicación cuidadosa, el desprendimiento total o parcial de la callosidad puede producir cierta reacción inflamatoria.

Si las molestias de callosidades aumentan o persisten durante el tratamiento, se debe dejar de usar y consultar al médico. Puede ser necesario establecer la causa del trastorno y tratarlo en consecuencia (medidas ortopédicas, corregir los apoyos, modificación en el calzado). Se debe evitar también las causas de incomodidad del pie (calzado estrecho, etc.).

Este medicamento contiene un excipiente volátil e inflamable y no debe usarse cerca de fuentes de calor como estufas, hornillas o cigarrillos encendidos. Contiene además aceite de ricino que puede causar reacciones en la piel.

Precauciones en niños y adolescentes: Sólo podría utilizarse en niños entre 2 y 12 años bajo supervisión médica.

En los niños menores de 12 años se utilizará este medicamento exclusivamente bajo control médico debido a que la menor queratinización de su piel permite mayor absorción del principio activo.

Precauciones en embarazo, lactancia y fertilidad: Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Salvo criterio médico no se debe utilizar durante el embarazo ni la lactancia.

Precauciones en personas de edad avanzada: Las personas mayores pueden tener problemas de los vasos sanguíneos, lo que se debe tener en cuenta por la posibilidad de aparición de efectos adversos.

Uso con otros medicamentos: Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Debe evitarse el uso simultáneo con otros medicamentos tópicos sobre la

misma zona afectada. No utilizar este medicamento junto con otros queratolíticos para evitar que se potencien los efectos de ambos productos.

Dosificación y duración del tratamiento:

Aplicar 1 vez al día, durante 6 días sobre el callo, dureza o verruga, preferentemente al acostarse.

Forma de uso: Uso cutáneo. Para el tratamiento de durezas y callosidades. Previamente a su aplicación se debe lavar la zona afectada con agua jabonosa caliente y secar.

Posteriormente, si fuera necesario, proteger la piel circundante al callo o la verruga con parafina blanca blanda (vaselina).

Luego de romper el precinto de seguridad y retirar la tapa del frasco, depositar la cantidad suficiente de la solución de HELLER® Plus sobre la espátula que acompaña al medicamento y aplicar cuidadosamente la cantidad suficiente de la solución cubriendo la zona afectada, evitar el contacto con la piel sana adyacente.

Al evaporarse el excipiente se forma una película que cubre la zona afectada y que, dependiendo de la zona tratada, puede protegerse con una gasahidrófila y un esparadrapo o una curita. Si olvidó aplicar oportunamente la solución de HELLER® Plus, no use una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Lavar las manos después de cada aplicación, excepto las zonas a tratar, si se encuentran en las manos.

El tratamiento de callosidades puede durar hasta 6 días, al cabo de los cuales se lavará la zona con agua caliente, después de diez minutos de baño se deberá iniciar el desprendimiento de la parte callosa frotando ligeramente con la mano.

Si los síntomas empeoran o si persisten durante el tratamiento o éste no fuese eficaz a los 4-6 días, debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental comuníquese con su médico o concurra con este prospecto al Centro de Salud más cercano. Es poco probable la intoxicación debido a la vía de administración (vía tópica). En caso de aplicación accidental en los ojos o mucosas, enjuáguese con abundante agua. La sobredosis o la ingestión accidental podrían producir síntomas de toxicidad sistémica por salicilatos.

Posibles efectos adversos: Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si al aplicar la solución ésta entra en contacto con la piel sana de las zonas adyacentes, puede aparecer irritación, quemazón, enrojecimiento, inflamación o incluso puede llegar a producirse una herida, en estos casos se recomienda suspender el tratamiento temporalmente hasta que la irritación desaparezca. Al reemprender el tratamiento, debe prestarse especial atención a que el producto sólo esté en contacto con la callosidad o la verruga.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comunique a su médico o a través de nuestra página <https://alfabolivia.com/es/farmacovigilancia/>.

Conservar HELLER® Plus en su envase cerrado de origen, protegido de la luz, alejado de fuentes de calor, a no más de 30°C.

MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE

N ° R.S.: NN-76154/2020

HELLER® Plus es fabricado por:
LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer. M. Prof. No. F-57
Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910

La Paz - Bolivia

www.alfabolivia.com

