

# HEMORROIDYL®

## Supositorio / Pomada

### Antihemorroidal

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a administrar el medicamento. Conserve este prospecto, puede tener la necesidad de volver a leerlo. Verifique que el envase y empaque corresponden al producto prescrito por el médico.

Siga las indicaciones del médico a cargo de la prescripción o tratamiento. Conserve los medicamentos de acuerdo a las instrucciones indicadas en este prospecto. Nunca dé a utilizar su medicamento a otra persona. Lávese las manos antes de utilizar el medicamento. No quite ni cambie el envase del medicamento. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **Mantenga los medicamentos fuera del alcance y vista de los niños. Informe al médico si los síntomas persisten, empeoran o si aparecen síntomas nuevos.**

FORMA FARMACEUTICA	COMPOSICION	PRESENTACION	VIA DE ADMINISTRACION
Supositorio	Cada supositorio contiene: Extracto fluido de Hamamelis 105 mg, Cinc óxido 200 mg, Bismuto subgalato 146 mg, Mentol 13 mg, Bálsamo del Perú 146 mg, Efedrina hidrocloreuro 20 mg y excipientes c.s.p. 1 supositorio.	Caja x 10 supositorios Caja x 100 supositorios	Vía rectal
Pomada	Cada 100 g de pomada contiene: Cinc óxido 10 g, Bálsamo del Perú 6 g, Bismuto subgalato 6 g, Extracto fluido de Hamamelis 4 g, Mentol 0,5 g, Efedrina clorhidrato 0,9 g y excipientes c.s.	Tubo x 50 g + cánula rectal Tubo x 100 g + cánula rectal	

**HEMORROIDYL®** medicamento antihemorroidal, ha sido formulado asociando el efecto anestésico local del Mentol y la acción vasoconstrictora de la Efedrina con las acciones astringentes, cicatrizantes y protectoras del Extracto fluido de Hamamelis, Cinc óxido, Subgalato de Bismuto y Bálsamo del Perú. No contiene corticoides.

**HEMORROIDYL® está indicado para el tratamiento de las siguientes patologías o situaciones:** Tratamiento de la inflamación de las hemorroides externas e internas (almorranas); tratamiento sintomático de afecciones que cursen con dolor y prurito o picazón en la zona ano rectal.

**No debe usarse HEMORROIDYL® en las siguientes situaciones:** Hipersensibilidad (alergia) a alguno de sus componentes.

**Precauciones generales para el uso de HEMORROIDYL®:** Informe a su médico si se le ha diagnosticado que es hipertenso, así como la medicación que le hayan recetado para el tratamiento de esta afección.

**Precauciones durante el embarazo y lactancia:** Si está embarazada o cree estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de usar este medicamento. Durante el embarazo y la lactancia debe seguir estrictamente las indicaciones de su médico.

**Conducción y uso de máquinas:** No se han observado efectos sobre la capacidad de conducción o utilización de maquinaria por el uso de **HEMORROIDYL®**.

**Uso con otros medicamentos:** Informe a su médico o farmacéutico si está o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

**Dosificación y duración del tratamiento:** Las dosis usuales recomendadas son:

- **Supositorio:** Un supositorio cada 12 horas hasta la remisión de los síntomas, pudiendo proseguir el tratamiento con un supositorio cada 24 horas, durante tres a cuatro días adicionales. Si los síntomas no mejoran a los siete días del tratamiento, debe consultar a su médico.

- **Pomada:** Aplicar con la ayuda del aplicador (cánula) una cierta cantidad de pomada en el conducto rectal y en caso necesario en la región perianal cada 12 horas hasta la remisión de los síntomas, pudiendo aplicar como terapia de mantenimiento cada 24 horas, durante tres a cuatro días adicionales.

Si los síntomas no mejoran a los siete días del tratamiento, debe consultar a su médico.

Se recomienda realizar un previo lavado con agua tibia de la región anal antes de aplicar la pomada o el supositorio. Complementar el tratamiento con la alternancia simultánea de baños fríos y templados de asiento con la finalidad de estimular de manera fisiológica la vasoconstricción y vasodilatación de las venas hemorroidales.

*Si olvidó administrar una de las dosis* simplemente continúe con la dosis habitual en la próxima administración del medicamento.

**Forma de uso de pomada:** Retire la tapa y el precinto de aluminio, enrosque la cánula al tubo, retire la cubierta de protección de la cánula e introduzca en el ano. A continuación, aplique la pomada ejerciendo una ligera presión sobre el tubo.

**Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental,** consulte inmediatamente a su médico o asista al Centro de Salud más próximo, llevando el prospecto del medicamento.

**Posibles efectos adversos:** Aunque a las dosis recomendadas no se han descrito efectos adversos, eventualmente podría producirse una absorción acumulativa de la Efedrina con efectos sistémicos indeseables como: aumento de la presión sanguínea, arritmia cardíaca, nerviosismo, temblor o insomnio. En ocasiones pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad (alergias).

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo.

En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comunique a su médico o a través de nuestra página: <https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>.

#### **Conservar**

**HEMORROIDYL® en su envase de origen, a temperatura ambiente inferior a 25° C, protegido de la luz. HEMORROIDYL® es un medicamento de venta con receta médica.**

#### **Registro Sanitario en Bolivia:**

**HEMORROIDYL® supositorio: NN-23800/2017**

**HEMORROIDYL® pomada: NN-71555/2019**

**HEMORROIDYL®** es fabricado por:  
LABORATORIOS ALFA S.A.  
Dir. Tec. Fco. Juan J. Ferrer M. Prof. No. F-57  
Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910  
La Paz - Bolivia  
[www.alfabolivia.com](http://www.alfabolivia.com)

