

LODINEST® 5 - LODINEST® 10

COMPRIMIDOS RANURADOS con 5 y 10 mg de AMLODIPINO ANTI HIPERTENSIVO ANTAGONISTA DEL CALCIO

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento. Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico. Este medicamento se le ha recetado para su uso personal y no debe administrarlo a otras personas, aunque los síntomas sean iguales o similares a los suyos. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso, no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Cada comprimido de LODINEST® 5 mg contiene: Amlodipino Besilato 6,945 mg (equivalente a 5,00 mg de Amlodipino), Almidón de maíz 18,4, Almidón glicolato de sodio 9 mg, Colorante Azul FDC No.1 (Laca) 0,10 mg, Colorante Amarillo FDC No. 5 (Laca), 0,25 mg y otros excipientes c.s.

Cada comprimido de LODINEST® 10 mg contiene: Amlodipino Besilato 13,89 mg (equivalente a 10,00 mg de Amlodipino), Almidón de maíz 18,40 mg, Almidón glicolato de sodio 9,00 mg, Colorante Azul FD&C No.1 (Laca) 0,10 mg, Colorante Rojo FD&C No. 40 (Laca) 0,20 mg y otros excipientes c.s.

LODINEST® pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antagonistas del calcio, se utiliza para tratar la tensión arterial alta (hipertensión); para el tratamiento de la angina de pecho crónica estable y también para el tratamiento de un tipo poco frecuente de angina que es la angina vaso espástica (de Prinzmetal) o angina variante.

En pacientes con tensión arterial alta este medicamento actúa relajando los vasos sanguíneos, de modo que la sangre pasa a través de ellos más fácilmente. En pacientes con angina, Amlodipino mejora la llegada de la sangre al músculo del corazón que así recibe más oxígeno y como resultado se previene el dolor en el pecho. Este

medicamento no proporciona un alivio inmediato del dolor en el pecho debido a la angina.

No tome LODINEST® comprimidos en las siguientes situaciones:

- Si es alérgico (hipersensible) a Amlodipino o cualquiera de los demás componentes del medicamento o a cualquier otro antagonista del calcio.
- Si tiene la tensión arterial muy baja (hipotensión).
- Si usted tiene en el corazón un estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica) o shock cardiogénico (una enfermedad en la que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo)
- Si usted sufre de insuficiencia cardíaca después de un ataque al corazón.

Antes de tomar LODINEST® informe a su médico si tiene o ha tenido: Ataque al corazón reciente. Insuficiencia del corazón. Aumento grave de la tensión sanguínea (crisis hipertensiva). Enfermedad del hígado.

Uso en niños y adolescentes: LODINEST® solo se debe utilizar para tratar la hipertensión arterial en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad.

Interacción de LODINEST® con otros medicamentos: Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

LODINEST® puede afectar o puede ser afectado por otros medicamentos tales como:

- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos antifúngicos).
- Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir (también llamados inhibidores de la proteasa utilizados para tratar el SIDA).
- Rifampicina, eritromicina, claritromicina (antibióticos).
- Hypericum perforatum (Hierba de San Juan).
- Verapamilo, Diltiazem (medicamentos para el corazón).
- Dantrone (en perfusión para las anomalías graves de la temperatura corporal).
- Otros medicamentos para tratar la hipertensión arterial.

Toma de Amlodipino con los alimentos y bebidas: Las personas que están tomando Amlodipino no deben consumir pomelo ni zumo de pomelo, esto se debe a que el pomelo y el zumo de pomelo pueden dar lugar a un aumento de los niveles en sangre del ingrediente activo Amlodipino, que puede causar un aumento imprevisible en el efecto de bajar la tensión sanguínea.

Embarazo y lactancia: Si usted cree que pueda estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, debe informar a su médico antes de tomar Amlodipino. Se desconoce si Amlodipino pasa a la leche materna. Si usted está dando de lactar, o está a punto de hacerlo, debe informar a su médico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas: Amlodipino puede afectar su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes: LODINEST® contiene Almidón como excipiente por lo que los pacientes celíacos deben consultar a su médico antes de usarlo. También contiene colorantes que pueden causar reacciones de tipo alérgico, incluso asma, especialmente en pacientes alérgicos a los salicilatos.

Forma de administración y dosis:

Tome siempre su medicamento exactamente como su médico le ha indicado. Consulte a su médico si tiene dudas.

La dosis inicial normal es 5 mg de Amlodipino, una vez al día. La dosis se puede aumentar a 10 mg de Amlodipino, una vez al día.

Puede tomar su medicamento antes o después de las comidas. Se lo debe tomar a la misma hora cada día, con un vaso de agua. No tome Amlodipino con zumo de pomelo.

Uso en niños y adolescentes: Para niños y adolescentes (entre 6-17 años de edad), la dosis inicial recomendada normalmente es de 2,5 mg al día. La dosis máxima recomendada es de 5 mg al día.

El médico le indicará durante cuánto debe tomar este medicamento. Es importante no interrumpir la administración

de los comprimidos. Su enfermedad puede reaparecer si deja de tomar este medicamento antes de que indique su médico.

Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental, comuníquese inmediatamente con su médico o concurra con el medicamento y con este prospecto al Hospital más cercano, o al Centro Nacional de Toxicología, (Emergencias Médicas), sito en Avda. Gral. Santos y T. Mongelos. Tel. 220 4108 Asunción-Paraguay.

Si olvidó tomar **LODINEST®** nunca debe tomar el doble de medicamento cuando le toque la siguiente dosis. Simplemente continúe con la dosis habitual en la próxima administración de medicamento. No cambie la dosis indicada por su médico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS: Al igual que todos los medicamentos, **LODINEST®** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran: Silbidos repentinos al respirar (sibilancias repentinas), dolor en el pecho, falta de aliento o dificultad para respirar. Hinchazón de los párpados, cara o labios. Hinchazón de la lengua y la garganta que causa gran dificultad para respirar. Reacciones graves de la piel que incluyen erupción cutánea intensa, habones, enrojecimiento de la piel por todo el cuerpo, picor, formación de ampollas, descamación e inflamación de la piel, inflamación de las membranas mucosas (Síndrome de Stevens Johnson) u otras reacciones alérgicas. Ataque al corazón, latido anormal del corazón. Inflamación del páncreas que puede causar dolor abdominal grave y dolor de espalda acompañado de gran sensación de malestar. Cambios de humor, ansiedad, depresión, insomnio. Dolor de cabeza, mareos, somnolencia (especialmente al principio del tratamiento). Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

CONSERVACIÓN DE LODINEST® COMPRIMIDOS:

Mantenga **LODINEST®** comprimidos fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conserve **LODINEST®** comprimidos a temperatura ambiente inferior a 30 °C.

No utilice **LODINEST®** comprimidos después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

LODINEST® de 5 y 10 mg se comercializan en cajas que contienen tres blísters de 10 comprimidos ranurados por caja (30 comprimidos ranurados por caja).

Registros Sanitarios en Bolivia:

- Comprimidos 5 mg II-62682/2017
- Comprimidos 10 mg II-62661/2017

LODINEST® comprimidos es fabricado por:
LABORATORIO PHARMA INDUSTRIES S.A.

Calle 1 e/ Avda. Pastora Céspedes y San Antonio - San Lorenzo, D.T.: Rosarito Paredes - Reg. Prof. N° 4.584
Asunción-Paraguay

Para: LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec. Fco. Juan J. Ferrer M. Prof. No. F-57
Avda. Busch N° 1970 Tel.: 2227910 La Paz - Bolivia
www.alfabolivia.com

Para: Pharmanest S.A.

Reg. Q.F. Ada Graciela Alderete Reg. Prof. No 2854.
C. Tte. Rigoberto Da Ponte esquina Siria.
Asunción-Paraguay. Tel.: (595-21)214 530/214 625

