

PRESTO®

SILDENAFILO 50 mg/comprimido

INHIBIDOR DE LA FOSFODIESTERASA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento. Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico. Este medicamento se le ha recetado para su uso personal y no debe administrarlo a otras personas, aunque los síntomas puedan ser iguales o similares a los suyos, ya que podría perjudicarles.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso, no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Contenido del prospecto:

1. Composición de PRESTO®
2. Qué es PRESTO® y para qué se utiliza.
3. Qué necesita saber y qué precauciones debe tomar antes de usar PRESTO®.
4. Cómo tomar PRESTO®.
5. Posibles efectos adversos.
6. Conservación de PRESTO®.
7. Presentaciones e información adicional.

1. COMPOSICIÓN DE PRESTO®

PRESTO® se comercializa en forma de comprimidos recubiertos, con 50 mg de sildenafil por comprimido. El principio activo se incorpora en forma de citrato de sildenafil y contiene lactosa y almidón como excipientes.

2. QUÉ ES PRESTO® Y PARA QUÉ SE UTILIZA:

PRESTO® pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre cuando se está sexualmente estimulado. PRESTO® sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado. No debe tomar PRESTO® si no tiene disfunción eréctil. El uso de PRESTO® no está indicado en mujeres.

PRESTO® está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, a veces denominada impotencia. Esto sucede cuando un varón no puede obtener o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria.

3. QUÉ NECESITA SABER Y QUÉ PRECAUCIONES DEBE TOMAR ANTES DE USAR PRESTO®

NO tome PRESTO® en las siguientes situaciones:

Si está tomando unos medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa. Consulte con su médico si está tomando cualquiera de estos medicamentos que, a menudo, se administran para aliviar el dolor de angina de pecho o dolor de pecho. Si no está seguro, consulte con su médico.

Si está utilizando cualquiera de los medicamentos denominados dadores de óxido nítrico, tales como nitrato de amilo ("poppers"), ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa.

Si es hipersensible a sildenafil o alérgico a cualquiera de los demás componentes de PRESTO®.

Si tiene problemas cardíacos o insuficiencia hepática.

Si ha padecido recientemente un accidente isquémico cerebral o ataque al corazón, o si tiene la tensión arterial baja. Si padece una rara enfermedad ocular hereditaria, tal como retinitis pigmentosa.

Si ha experimentado anteriormente una pérdida de la visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA-NA).

Tenga especial cuidado con el uso de PRESTO® e Informe a su médico en los siguientes casos:

Si padece anemia falciforme (una anomalía de los glóbulos rojos); leucemia o cáncer de las células sanguíneas; mieloma múltiple o cáncer de médula ósea. Si padece una deformidad del pene (enfermedad de Peyronie o IPP: Induración Plástica del Pene). Si padece problemas del corazón. En ese caso, su médico debe comprobar cuidadosamente si su corazón puede soportar el esfuerzo adicional de mantener relaciones sexuales. Si padece actualmente úlcera de estómago o problemas hemorrágicos tales como hemofilia. También debe comunicar a su médico si tiene problemas renales o hepáticos. Si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión, deje de tomar PRESTO® y contacte con su médico inmediatamente.

No se aconseja utilizar PRESTO® simultáneamente con ningún otro tratamiento oral o local para la disfunción eréctil.

Consideraciones especiales en niños y adolescentes: El uso de PRESTO® no está indicado en personas menores de 18 años.

Administración de PRESTO® con otros medicamentos: Comunique a su médico que está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Los comprimidos de PRESTO® pueden interferir con algunos medicamentos, especialmente los utilizados para tratar el dolor de pecho. En caso de una urgencia médica, debe informar a cualquier profesional sanitario que está tomando PRESTO® y cuándo lo tomó. No debe tomar PRESTO® con otros medicamentos a menos que su médico se lo aconseje. No debe tomar PRESTO® si está tomando medicamentos denominados nitratos, ya que la combinación de estos productos puede causar un descenso potencialmente peligroso de su presión sanguínea. Siempre informe a su médico o farmacéutico si está tomando cualquiera de estos medicamentos que, a menudo, se utilizan para aliviar el dolor de la angina de pecho (o "dolor de pecho").

No debe tomar PRESTO® si está tomando medicamentos denominados dadores de óxido nítrico, tales como nitrato de amilo ("poppers"), ya que la combinación de estos productos también puede dar lugar a un descenso de su presión sanguínea potencialmente peligroso. Si está tomando medicamentos conocidos como inhibidores de la proteasa, como los utilizados en el tratamiento del VIH, su médico puede recomendarle que comience el tratamiento con un dosis más baja de 25 mg.

Algunos pacientes que están recibiendo un alfa bloqueante, medicamento utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta o de la hipertrofia prostática, pueden experimentar mareos o sensación de desvanecimiento que pueden ser causados por una disminución de la tensión arterial al sentarse o levantarse rápidamente. Algunos pacientes han experimentado estos síntomas al tomar PRESTO® con alfa bloqueantes. Esto es más probable que ocurra en las 4 horas siguientes a la toma de PRESTO®. Con el fin de disminuir la probabilidad de que ocurran estos síntomas, deberá estar recibiendo su dosis diaria del alfa bloqueante de forma regular antes de comenzar con PRESTO®.

Toma de PRESTO® con alimentos, bebidas y alcohol: PRESTO® puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que PRESTO® tarde un poco más en hacer efecto si se ingiere con una comida copiosa. La ingesta de alcohol puede dificultar, temporalmente, la capacidad para obtener una erección. Por lo tanto, para conseguir el máximo beneficio del medicamento, se aconseja no ingerir grandes cantidades de alcohol antes de tomar PRESTO®.

Embarazo, lactancia y fertilidad: El uso de PRESTO® no está indicado en mujeres.

Conducción y uso de máquinas: PRESTO® puede producir mareos y afectar a la visión. Debe saber cómo reacciona usted a PRESTO® antes de conducir vehículos o utilizar maquinaria.

Información importante sobre algunos de los componentes: PRESTO® contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Este medicamento también contiene almidón por lo que los pacientes celíacos deben consultar con su médico antes de utilizarlo.

4. CÓMO TOMAR PRESTO®

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

La dosis recomendada es de 50 mg.

Debe tomar PRESTO® aproximadamente una hora antes de que planee tener relaciones sexuales. Trague el comprimido entero con un vaso de agua.

No se debe tomar PRESTO® más de una vez al día.

Si estima que la acción de PRESTO® es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico.

PRESTO® sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado.

El tiempo que necesita PRESTO® para hacer efecto varía de una persona a otra, generalmente oscila entre media y una hora. El efecto de PRESTO® puede retrasarse si lo toma con una comida copiosa.

En el caso de que PRESTO® no le ayude a conseguir una erección o si la erección no se mantiene el tiempo suficiente para completar el acto sexual, consulte a su médico.

Si toma más PRESTO® del que debe,

to en los efectos secundarios y su gravedad. Dosis superiores a 100 mg no aumentan la eficacia. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico, indicando el medicamento y la cantidad administrada.

No debe tomar más comprimidos de los recomendados por el médico.

Contacte con su médico si ha tomado más comprimidos de los aconsejados.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

5. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Al igual que todos los medicamentos, PRESTO® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos notificados asociados al uso de PRESTO® son por lo general de intensidad leve a moderada y de corta duración.

Si usted sufre dolores de pecho durante o después de mantener relaciones sexuales:

– Sitúese en una posición semi sentado e intente relajarse

No use nitratos para tratar su dolor en el pecho y contacte con su médico inmediatamente,

Todos los medicamentos, incluyendo PRESTO®, pueden causar reacciones alérgicas. Debería contactar con su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de tomar PRESTO®: Silbido repentino al respirar, dificultad para respirar o mareos, hinchazón de los párpados, cara, labios o garganta.

Se han notificado casos de erecciones prolongadas y a veces dolorosas después de tomar PRESTO®. Si usted tiene una erección que dura más de 4 horas, debe contactar con su médico inmediatamente.

Si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión, deje de tomar PRESTO® y contacte con su médico inmediatamente.

El efecto adverso más frecuente (Puede afectar a más de 1 de cada 10 personas) es el dolor de cabeza.

Los efectos adversos frecuentes (Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas) incluyen:

Enrojecimiento facial, indigestión, efectos sobre la visión (incluyendo percepción anormal del color, sensibilidad a la luz o visión borrosa o disminución de la agudeza visual), congestión nasal y mareos.

Efectos adversos poco frecuentes (1 y 10 de cada 100 pacientes) incluyen: vómitos, erupciones cutáneas, sangrado en la parte posterior del ojo, ojo lloroso, irritación ocular, derrame ocular, ojos rojos, dolor ocular, visión doble, sensación anormal en el ojo, latido cardíaco irregular o rápido, dolor muscular, sensación de somnolencia, sensación al tacto reducida, vértigo, pitidos en los oídos, náuseas, boca seca, dolor en el pecho y sensación de cansancio, sangrado del pene, presencia de sangre en el semen y/o en la orina.

Efectos adversos raros (entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes) incluyen: ataque cardíaco, presión arterial alta, presión arterial baja, desvanecimiento, accidente cerebrovascular, sangrado de la nariz y disminución o pérdida repentina de la audición.

Los efectos adversos muy raros, (1 y 10 de cada pacientes) notificados de la experiencia post

comercialización incluyen: palpitaciones, dolor de pecho, muerte súbita, o disminución transitoria del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro. La mayoría de los casos reportados, pero no todos ellos, eran de pacientes que tenían problemas cardíacos antes de tomar este medicamento. No es posible determinar si estos acontecimientos estuvieron relacionados directamente con el uso de sildenafil. También, se han notificado casos de convulsiones o crisis y reacciones graves de la piel que cursan con erupción, ampollas, descamación de la piel y dolor que requieren asistencia médica inmediata.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

6. CONSERVACIÓN DE PRESTO®

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar protegido de la luz y en su envase de origen entre 15 y 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

7. PRESENTACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESTO® se presenta en cajas que contienen un blister con 4 comprimidos recubiertos, elípticos, biconvexos.

N° R.S.: II-55591/2020

PRESTO® comprimidos recubiertos es fabricado

Por:

SCOTT - EDIL PHARMACIA LTD.

56, E.P.I.P, Phase 1, Jharmajri, Baddi,
INDIA

Para:

LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer, M.Prof. N° F-57.

Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2 - 2227910
La Paz - Bolivia.

www.alfabolivia.com

