

PROCTOGEL®

SUPOSITORIOS ANTIHEMORROIDAL CON CORTICOIDE INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Lea detenidamente toda la información del prospecto antes de empezar a usar este medicamento. Conserve este prospecto, puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico. Este medicamento se le ha recetado para su uso personal y no debe administrarlo a otras personas: puede perjudicarles, aunque los síntomas puedan ser iguales o similares a los suyos.

1. COMPOSICIÓN DE PROCTOGEL® SUPOSITORIOS:

Cada supositorio contiene: Prednisolona Pivalato 2 mg, Lidocaína hidrocloreto 45 mg, Troxerutina 60 mg. Excipientes c.s.p. 1 supositorio.

2. QUÉ ES PROCTOGEL® SUPOSITORIOS Y PARA QUÉ SE UTILIZA:

PROCTOGEL® es un medicamento antihemorroidal que contiene un corticoide (Prednisolona Pivalato). Las propiedades antiinflamatorias de la Prednisolona Pivalato, anestésica local de la lidocaína hidrocloreto y protectora vascular de la Troxerutina hacen que la acción antihemorroidal sea eficaz, proporcionando un alivio sintomático del ardor, prurito, dolor, tumefacción, irritación y malestar.

PROCTOGEL® supositorios está indicado para el tratamiento de hemorroides internas y externas.

3. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR PROCTOGEL® SUPOSITORIOS:

No use PROCTOGEL® supositorios en los siguientes casos:

- Si sufre alergia (hipersensibilidad) a alguno de sus componentes. Informe a su médico si ha sufrido alguna reacción alérgica anterior a algún medicamento.
- Si se le ha diagnosticado una infección vírica, tuberculosa o bacteriana en la zona a tratar.

Embarazo y Lactancia: Consulte a su médico y siga estrictamente sus indicaciones.

Conducción y uso de máquinas: No se han observado efectos de PROCTOGEL® supositorios sobre la capacidad de conducción o utilización de maquinaria.

Uso de otros medicamentos: Informe a su médico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

4. CÓMO USAR PROCTOGEL® SUPOSITORIOS:

Aplicar los supositorios, preferentemente después de las defecaciones y previo lavado de la zona afectada. Para su administración es conveniente estar acostado hacia un lado e introducir el supositorio en la zona ano rectal por su extremo más delgado, empujándolo con el dedo. Luego debe lavarse las manos.

La dosis usualmente recomendada es de un supositorio cada 12 horas hasta la remisión de los síntomas, pudiendo proseguir el tratamiento con un supositorio cada 24 horas, durante tres a cuatro días adicionales. Si los síntomas no mejoran a los siete días del tratamiento, debe consultar a su médico.

Se recomienda complementar el tratamiento con la alternancia simultánea de baños fríos y templados de asiento con la

finalidad de estimular de manera fisiológica la vasoconstricción y vasodilatación de las venas hemorroidales.

Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental:

En caso de ingestión accidental o intoxicación por sobredosis debe consultar inmediatamente a su médico o acudir al centro de Salud más próximo con el prospecto de este medicamento.

Si olvidó administrar una de las dosis: simplemente continúe con la dosis habitual en la próxima administración del medicamento.

5. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Como todos los medicamentos, PROCTOGEL® supositorios puede tener algunos efectos adversos, aunque a las dosis recomendadas no se han descrito efectos secundarios adversos. En ocasiones, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad (alergias).

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso descrito, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Es importante notificar sospechas de efectos adversos al medicamento, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del mismo. En caso de presentar posibles efectos adversos no descritos en este prospecto, comuníquese a su médico o a través de nuestra página: <https://alfabolivia.com/es/farmaco-vigilancia/>.

6. CONSERVACIÓN DE PROCTOGEL® SUPOSITORIOS:

Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conserve PROCTOGEL® supositorios a temperatura ambiente inferior a los 30°C, protegido de la luz.

No utilice PROCTOGEL® supositorios después de la fecha de vencimiento indicada en la caja.

7. PRESENTACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROCTOGEL® supositorios se comercializa en cajas que contienen 10 y 100 supositorios por caja.

Registro Sanitario en Bolivia: NN - 22865/2017

PROCTOGEL® es fabricado por:
LABORATORIOS ALFA S.A.

Dir. Tec. Fco.: Juan J. Ferrer. M. Prof. No. F-57
Avda. Busch N° 1970. Tel.: (591) 2-2227910

La Paz - Bolivia

www.alfabolivia.com

